



INFORMACIÓ PER A LES FAMÍLIES

La Asociación Española de Pediatría (AEP) recomana per a la població infanto-juvenil algunes vacunes **NO FINANÇADES** pel Servei Català de la Salut en el moment actual. Aquestes vacunes són les següents:

1. **Vacunes enfront del pneumococ:** *Prevenar13*[®] cobreix 13 serotipus i *Synflorix*[®] 10 serotipus. El pneumococ és un bacteri que pot causar infeccions greus com ara meningitis, bacterièmia o pneumònia, principalment en nens petits. El 85 % dels casos es donen en persones menors de 5 anys. Les vacunes disponibles al mercat són molt segures i eficaces. S'ha d'administrar sempre el mateix preparat comercial en cada dosi. S'administren 3 dosis, als 2,4 i 6 mesos d'edat i una 4^a dosi de record entre els 12 i 15 mesos de vida. Són compatibles amb la resta de vacunes del calendari vacunal d'aquestes edats. La AEP recomana Prevenar 13
2. **Vacuna enfront del rotavirus.** *Rotateq*[®]. El rotavirus és la principal causa d'hospitalització per diarrea en els primers anys de vida i afecta, almenys una vegada, a tots els nens menors de 5 anys. La vacuna disponible ha demostrat la seva seguretat i eficàcia. S'administren 3 dosis a partir de les 6 setmanes de vida i abans de les 32 setmanes separades com a mínim 4 setmanes. La primera dosi ha d'administrar-se abans de la 12 setmana de vida.
3. **Vacuna enfront del virus de varicel·la.** . *Varivax*[®] *Varilrix*[®] . La varicel·la afecta a 400.000 persones l'any a Espanya amb una mitjana de 1500 hospitalitzacions. És més freqüent en els primers anys de vida tot i que sol ser menys greu. La vacuna disponible és eficaç i segura. S'administren 2 dosis: una als 13-15 mesos i una altra als 2-4 anys. Als 12 anys està finançada pel Servei Català de la Salut pels infants que no han patit la malaltia.
4. **Vacuna enfront del meningococ tipus B:** Bexsero[®]. El meningococ és un bacteri que pot causar meningitis o bé una infecció generalitzada a tot el cos, denominada sèpsia. El tipus B és el més freqüent a tota Europa. És immunògena i segura. S'administren 3 dosis, als 2,4 i 6 mesos d'edat i una 4^a dosi de record entre els 12 i 15 mesos de vida. És compatible amb la resta de vacunes del calendari vacunal d'aquestes edats llevat de la vacuna enfront del meningococ tipus C, per manca d'estudis. Pot provocar febre amb més probabilitat que la resta de les vacunes si s'administra conjuntament amb d'altres vacunes del calendari

Si voleu més informació o administrar aquestes vacunes consulteu amb el vostre pediatre. També podeu consultar la informació del Comité Asesor de Vacunas de la AEP a la següent pàgina web: www.vacunasaep.org