

AVALUACIÓ PREANESTÈSICA DE VIA AÈRIA

NO DIFÍCIL

POTENCIALMENT DIFÍCIL

DIFÍCIL EVIDENT O CONEGUDA

HISTÒRIA CLÍNICA

Sense antecedents de VAD.
Sense patologia associada.

Criteris de risc elevat:

- BMI > 40
- SAOS o roncadors diaris severos
- Patologia associada a VAD: massa tiroïda, angina de Ludwig, acromegàlia

Criteris addicionals:

- Edat > 50
- Sexe masculí
- Dents prominents
- Dispnea o disfàgia



Història prèvia de VAD,
si persisteixen els criteris o els factors causants.

Presència de criteris evidents de dificultat:
Deformitats o traumatismes cervicofacials
Patologia obstructiva o deformant de la via aèria


PRESENCIA D'ALGÚN D'AQUESTS CRITERIS DE DIFICULTAT COMUNS A TOTES LES TÈCNiques DE MANEIG DE LA VIA AÈRIA

CLASSE MALLAMPATI

Es realitza amb el pacient assegut, el cap en posició neutra, boca oberta, llengua fora i en fonació "aaa".
Es valora segons la visualització de les estructures faringies (úvula, pilars i/o paladar tou).





PLASTICITAT REDUÏDA PER IRRADIACIÓ DEL COLL



SUBLUXACIÓ MANDIBULAR


Valora la capacitat de desplaçar la mandíbula per davant del maxil·lar superior. Es demana que avanci els incisius inferiors per davant dels superiors o que es mossegui el llavi superior.




DISTÀNCIA INTERDENTAL

Amb la boca oberta al màxim i lleugera extensió cefàlica, es mesura en la línia mitja la distància interincisiva (o la distància entre la vora d'oclusió de les genives, en el pacient edentat).


Exploració de dalt a baix



Distància interdental > 5 cm






Distància interdental 2 - 3 cm



Distància interdental < 2 cm

RANG DE MOVIMENT CAP I COLL


Amb el pacient assegut, de perfil i cap en posició neutra. Es demana al pacient que estengui al màxim el cap enrere. Es valora la posició del mentó respecte a la prominència occipital.




Mobilitat del coll < 80°

DISTÀNCIA TIRO-MENTONIANA

Distància que hi ha entre la prominència del cartílag tiroide i el mentó, amb la boca tancada i el cap en hiperextensió.



> 6,5 cm



< 6,5 cm

DIFÍCIL EVIDENT O CONEGUDA

PRESENCIA DE 3 O MÉS CRITERIS DE RISC DE VENTILACIÓ O INTUBACIÓ A LA HISTÒRIA CLÍNICA O EXPLORACIÓ

LA PROBABILITAT DE DIFICULTAT AUGMENTA AMB EL NOMBRE DE CRITERIS PRESENTS

ALTRES FACTORS QUE CAL CONSIDERAR INDIVIDUALMENT

Condicions del pacient:

- Risc broncoaspiració
- Poca tolerància a l'apnea
- Manca de col·laboració
- Grau d'urgència


Experiència de l'anestesiòleg:

- En les tècniques habituals
- En les tècniques de rescat

Factors de l'entorn:

- Material i ajuda disponible

VENTILACIÓ DIFÍCIL



Edentació

Barba

Sleep apnea/roncadors

BMI > 30



Societat Catalana d'Anestesiologia, Reanimació i Terapèutica del Dolor