

Comunicat per administració immunoteràpia específica subcutània amb al·lèrgens inhalants i vacuna COVID-19

Benvolgudes, benvolguts,

D'acord a les reaccions adverses locals descrites en relació a l'administració de la vacuna de la COVID-19^{1,2,3} i a les dades en vida real de població del nostre entorn que ha estat vacunada on es descriuen alguns casos de reaccions locals intenses tant immediates com de forma retardada, des de la SCAIC s'aconsellen les següents consideracions pràctiques per a l'administració de la immunoteràpia específica subcutània amb al·lèrgens inhalants (ITSC) quan coincideixin amb l'administració de la vacuna de la COVID-19.

- 1) En cap cas es recomana no administrar la vacuna de la COVID-19 o retrassar la seva administració per coincidir amb la ITSC.
- 2) Espaiar la dosi de la vacuna de la COVID-19 i la ITSC 1 setmana.
- 3) Es recomana administrar la següent dosi d'ITSC posterior a la vacuna de la COVID-19 en el braç contralateral al de l'administració de la vacuna per la Covid, malgrat sigui tornar-la a administrar en el mateix braç que s'havia administrat en la dosi anterior.
- 4) L'espaiament d'una setmana, aplica tant en les dosis d'ITSC d'inici com de manteniment.
- 5) Per aquest espaiament d'una setmana es pot modificar la pauta inicialment establerta pel metge responsable de la prescripció de la ITSC.
- 6) Recordar que:
 - a) La ITSC s'ha d'administrar sempre per part d'infermeria o metge en un centre sanitari amb les mesures adients per tractar precoçment les potencials reaccions adverses⁴
 - b) El pacient ha d'estar en observació durant 30 minuts després de la seva administració⁴

1. Fitxa tècnica vacuna Comirnaty Pfizer BioNTech
2. Fitxa tècnica vacuna de Moderna COVID-19 (mRNA-1273)
3. Fitxa tècnica Vacuna de Astra-Zeneca frente a COVID-19 (ChAdOx1-S [recombinante])
4. E Alvarez-Cuesta, et al. Standards for practical allergen-specific immunotherapy. Allergy . 2006;61 Suppl 82:1-20